

Consento® SC 450 vil være aktuelt å benytte ved de første behandlinger hvor man har stor tilvekst av ris. En sprøyteplan med bruk av Consento® SC 450® tidlig i sesongen og andre midler med en annen virkemekanisme senere i sesongen, eventuelt med Consento® SC 450 som alternativ ved angrep, vil kunne være en god behandlingsstrategi.

Sprøyt i oppholdsvær og på tørre planter. Consentio SC 450 tas opp i plantene i løpet av 1- 2 timer, og er deretter regnfast.

Under gode sprøyteforhold anbefales vanlige flatdyser. Under mindre optimale forhold (svak vind) kan LowDrift dyser benyttes.

Dyse	Trykk	Hastighet	Vannmengde
ISO 110 025 (lilla)	2,6 bar	5,6 km/t	20 ltr/ daa
ISO 110 030 (blå)	2,8 bar	7,0 km/t	20 ltr/ daa
ISO 110 040 (rød)	2,5 bar	5,8 km/t	30 ltr/ daa

Fyll tanken minst halvfull med vann. Start røreverket. Tilsett preparatet og fyll opp med vann. Sørg for god røring i tanken før og under sprøyting.

Det er viktig med god sprøyteknikk slik at man oppnår god dekning av stengler og blad. Dette sikres ved bruk av tilstrekkelige vannmengder samt dyser som gir en god forstøvning av sprøytevæsken. Man skal selvsagt sikre at det er jevn og korrekt fordeling av væske over hele sprøytebommen. Benytt flatdyser, f.eks. en ISO 110-02 dyse med et trykk på 2,0 – 3,0 bar eller en tilsvarende LowDrift dyse.

Consento SC 450 kan blandes med insektmidler. Bland ikke med ugrasmidler.

Consento SC 450 må lagres frostfritt.

Bruk vernehansker av nitril/ neopren av god kvalitet og heldekkende arbeidstøy ved håndtering og bruk av preparatet.

Ved uhell eller mistanke om forgiftning kontakt lege eller Giftinformasjonen tlf. 22 59 13 00.

Tommeballasjen skylles minst 3 ganger med vann og innholdet tømmes i sprøytetanken. Rester fra sprøytetanken fortynes nøyaktig omlag 5 ganger med vann og sprøytes ut i henhold til bruksrettedningen. Skyll sprøytestyret med vann etter bruk på et sted som ikke gir fare for forurensning av vannforekomster. Ved skifte av preparat for sprøytning i ømfintlige kulturer må sprøytestyret rengjøres med soda, salmiakk eller annet anbefalt vaskemiddel.

Rengjort emballasje bringes til lovlig avfallsanlegg. Plastemballasje kildesorteres. Konsentrerte preparater og ikke rengjort emballasje må innleveres til mottak for farlig avfall.

Vi garanterer at preparatet holder rett kvalitet. Dette innebærer ingen garanti for at preparatet under alle forhold har den ønskede virkning. Bruksrettleiingen er basert på forsøk og erfaring. Dersom preparatet brukes på annen måte eller under andre forhold enn angitt på etiketten, bortfaller vårt ansvar ved eventuell skade eller manglende virkning.

® is a registered trademark of the Bayer Group



Importør:
Bayer AS
Bayer CropScience
Postboks 14
N-0212 Oslo
Tlf. 91 14 71 60

Tilvirker:
Bayer CropScience AG
Monheim, Tyskland



Bayer CropScience



Bruksrettleddningen må følges, slik at man unngår risiko for menneske og miljø. Det er forbudt å bruke Consento® SC 450 i strid med godkjent bruksområde eller behandlingsfrist, eller å overskride den tillatte maksimale dosering/ konsentrasjon.

Consento SC 450 er tillatt brukt mot potet-
tørråte i potet.

Siste sprøyting må ikke skje senere enn 7 dager før høsting.

Consento SC 450 virker mot potettrørråte. Preparatet har god forebyggende og kurativ virkning. Consento SC 450 vil derfor egne seg godt til første behandling dersom man har smitte i settepotetene, og i tilfeller med tidlig angrep. Midlet vil også kunne være et alternativ senere i sesongen på grunn av sin gode beskyttelse av ny tilvekst og gode sporedrepende effekt.

Preparatet inneholder to virksomme stoffer. Fenamidon har translaminær (lokal-systemisk) virkning. Det betyr at preparatet trenger gjennom bladvevet og beveger seg inn i de nærmeste cellene rundt treffpunktet på potetplanten. Propamokarb er et systemisk preparat som transporterer med saftstrømmen og beskytter derfor også deler av blad og stengel som ikke direkte blir truffet av sprøytevæskene. Den systemiske virkningen sikrer god beskyttelse av ny tilvekst. De to stoffene gir god samvirking.

Resistens mot fenamidon hos potetttørråte er ikke kjent, men som for alle andre stof-

fer bør man minimere muligheten for at slik resistens skal oppstå. Produkter hvor fenamidon inngår bør derfor ikke benyttes i mer enn 50 % av antall behandlinger i sesongen, og maksimalt 3 behandlinger per sesong.

Describing

vann.

Antall behandlinger/ Maksimal dosering per år.

Kultur	Maks. antall behandlinger
Poteter	3

Consento SC 450 kan benyttes fra vekststadium BBCH 39 til vekststadium BBCH 90. Smittepress, klima og sortens mottagelighet overfor potetorråte avgjør når og hvor ofte det vil være behov for å sprøyte. Først sprøyting bør foretas ved risiko for angrep (ved tørråtevarsel) og tidligst når potetriset er 20- 25 cm høyt (like før eller omkring slutthyping). Dersom man har stor sannsynlighet for smitte på settepotetene vil Consento SC 450 være et godt alternativ ved første sprøyting. Consento SC 450 vil også være et godt valg i den perioden potetriset vokser mest på grunn av sin gode beskyttelse av ny tilvekst og sporehemmende virkning. De tidlige behandlinger kan eventuelt utføres med noe lavere dose. I perioder med høyt smittepress eller ved angrep benyttes Consento SC 450 alltid med full dosering for å få en best mulig beskyttelse av potetene. Virkningen av en behandling med Consento SC 450 varer 7- 12 dager, men lengste intervall kun i lavrisiko perioder samt ved full dosering. Consento SC 450 brukes maksimalt 3 ganger per sesong.

RIFMO	PMR: NO80854382B		Bayer CropScience DK	
	Form.: 576x150,5 mm Artwork: 9823A Job no.: 34-4333/2133	Date: 18-11-2014 Country: NO Colour: CMYK	☒ Use only for corrections ☐ Print Ready PDF for upload to Server	