

Korn	Sykdom	Dose	Behandlingstid
Høstkorn	Snømugg, trådkolle.	50- 70 ml/ daa	I løpet av oktober, tidligst der snoen kommer først.
Høst- og vårhvete	Stråknækker, mjøldogg, gulrust, brunrust, hveteaksprikk (" Stagonospora nodurum "), hvetebladprikk (" Septoria tritici "), hvete-brunflekk (DTR). Fusarium spp.	50- 100 ml/ daa 80-100 ml/ daa	Ikke før begynnende strekning (Z30) til avsluttet blomst (Z69).
Bygg	Mjøldogg, grå øyeflekk, gulrust, dvergrust, byggbrunflekk, spragleflekk (Ramularia). Fusarium spp.	40- 80 ml/ daa 80 ml/ daa	Grå øyeflekk: Fra begynnende strekning (Z30) Byggbrunflekk og spragleflekk: Ikke før flaggbladet er framme (Z39). Fusarium til Z61.
Rug	Stråknækker, mjøldogg, brunrust, grå øyeflekk, hveteaksprikk. Fusarium spp.	50-100 ml/ daa	Største dose ved sent angrep. Fusarium til avsluttet blomst (Z69).
Rughvete	Stråknækker, mjøldogg, rust, grå øyeflekk, hveteaksprikk. Fusarium spp.	50-100 ml/ daa	Når angrep merkes. Fusarium til avsluttet blomst (Z69).
Havre	Mjøldogg, rust, havrebrunflekk, havreseptoria. Fusarium spp.	40-80 ml/ daa 80 ml/ daa	Når angrep merkes. Fusarium til Z61.
Gras i grøntanlegg	Snømugg, trådkolle.	50-100 ml/ daa	I løpet av oktober, tidligst der snoen kommer først.

RIFMO	PMR: NO79115482D		Bayer CropScience DK	
	Form.: 576x150,5 mm	Date: 10-12-2014	☒ Use only for corrections	
	Artwork: 9823A	Country: NO	☐ Print Ready PDF for	
	Job no.: 31-4072/2456	Colour: CMYK	upload to Server	