

monceren® FS 250

Behandling ved setting:
Monceren FS 250 sprøytes direkte på settepotetene og i setteraden med utstyr påmontert potetsetteren. Det er viktig å dekke settepotetenes overflate så godt som mulig med sprøytevæska for å bekjempe smitten. Det bør brukes to dyser per rad.

Dosering: Bruk 600 ml per tonn settepoteter

Dersom man beiser med Monceren FS innendørs, SKAL det sikres at potetene tørker forsvarlig opp med én gang etter beisingen og FØR de settes til videre oppbevaring.

BEISETEKNISKE FORHOLD/ RAD- AVSTAND VED BEISING I SETTER

Ved beising i setteren (Viby, Wassèn) brukes så liten væskemengde som mulig. Bruk 2 – 4 ltr/ tonn poteter. Sørg for at dysene er montert ca. 20 cm fra medbringerkjedet, slik at væsken ikke treffer dette.

Ved bruk av "Hardi teknikken" sprøytes potetene under fritt fall fra setteren mot jorda. Det monteres to dyser per rad med en innbyrdes avstand på 25 cm. Dysene stilles slik at de dekker potetene fra 2 forskjellige sider. Dysene skal peke skrått nedover i vinkler på henholdsvis 25° og 35°. Så lenge det kan medføre økt smitterisiko for stengelbakteriose (blotråte) er det viktig at dysene stilles inn på en slik måte at væskedusjen ikke treffer medbringerkjedene. For å hindre at midlet størkner og man får en tilstopping av dysene bør det skylles gjennom slanger og dyser hver dag etter endt beising. Beising av lysgrodde poteter er også mulig.

Eksempler for setting ved

Rad- avstand	Dysenr.	Km/h	Trykk	Vann
0,75	2x1299-8	6	2,5	7 l/ daa
0,80	2x1299-8	6	2,9	7 l/ daa
0,75	2x1299-8	7	3,4	7 l/ daa
0,75	2x1299-8	7	3,9	7 l/ daa

FORSIKTIGHETSREGLER

Bruk vernehansker av nitril/ neopren av god kvalitet, og overtrekksdress ved håndtering og bruk av preparatet. Ved langvarig sprøyting og når det er fare for innånding av damp/sprøytetåke, skal halvmaske med kombinasjonsfilter A1/ P3 brukes. Tilsølte klær må fjernes og vaskes før bruk. Vask hender og ansikt når arbeidet er ferdig eller avbrytes.

Ved uhell eller mistanke om forgiftning kontakt lege eller Giftinformasjonen tlf. 22 59 13 00.

RENGJØRING

Skyll beiseutstyret med vann etter bruk på et sted som ikke gir fare for forurensing av vannforekomster.

AVFALLSHÅNDTERING

Rengjort emballasje bringes til lovlig avfallsanlegg. Plastemballasje kildesorteres. Konsentrerte preparater og ikke rengjort emballasje må innleveres til mottak for farlig avfall.

Ubenyttet beiset settepoteter må innleveres til mottak for farlig avfall.

monceren® FS 250

LAGRING
Må lagres frostfritt


MERK

Vi garanterer at preparatet holder rett kvalitet. Bruksanvisningen er basert på forsøk og erfaring. Dette innebærer ingen garanti for at preparatet under alle forhold har forventet virkning. Hvis preparatet håndteres eller brukes på annen måte eller under andre vilkår enn angitt på etiketten, bortfaller vårt ansvar ved eventuell skade eller manglende virkning.

® is a registered trademark of the Bayer Group

Tilvirker:
Bayer CropScience AG
Monheim, Tyskland

Importør:
Bayer AS
Bayer CropScience
Postboks 14
N-0212 Oslo
Tlf. 91 14 71 60



monceren® FS 250

Pencycuron
Suspensionskonsentrat

5 liter

Flytende soppmiddel til beising mot svartskurv i potet.

Sammensetning:
Pencycuron 250 g/l
Vann og fyllstoffer 798 g/l

ADVARSEL

Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
Unngå innånding av aerosoler.
Tilsølte arbeidsklær må ikke fjernes fra arbeidsplassen.
VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann og såpe.
Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.
Oppbevares innelåst.
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk egnet verneutstyr (se forsiktighetsregler).
Uskadeliggjør tomemballasjen (se avfallshåndtering).

Reg.nr. 2008.70.14

AVGIFTSKLASSE: 1

Reg.nr. 2008.70.14

Tilvirker:
Bayer CropScience AG
Monheim, Tyskland

Importør:
Bayer AS
Bayer CropScience
Postboks 14
N-0212 Oslo
Tlf. 91 14 71 60

NO05762358I

monceren® FS 250

Bruksrettledningen må følges, slik at man unngår risiko for menneske og miljø. Det er forbudt å bruke Monceren® FS 250 i strid med godkjent bruksområde eller behandlingsfrist, eller å overskride den tillatte maksimale dosering/ konsentrasjon.

BRUKSOMRÅDE

Monceren FS 250 er et flytende soppmiddel tillatt brukt til beising av settepoteter.

VIRKEOMRÅDE

Monceren FS 250 har god effekt mot svartskurv (**Rhizoctonia solani**).

VIRKEMÅTE

Monceren FS 250 er et kontaktvirkende middel. Effekten sikres ved god dekning av materialet som behandles.

BRUKSRETTLEDNING

Poteter

Settepotetene er den viktigste smitekilden for svartskurv (svarte hvilelegemer), men jordsmitte er også vanlig. Forkultur og omløp har stor betydning for jordsmitte.

Behandling av settepoteter ved utsortering:

Behandling med Monceren FS 250 kan gjøres ved utsortering. Det er viktig at potetene er frie for jord slik at Monceren FS 250 kommer i god kontakt med svartskurv sklerotiene (hvilelegemer).

Behandling av settepoteter som er lagt til for-groing:

Behandlingen utføres like før groene stikker frem. Dermed unngås smitte på gropig-gene.

Dosering:

Bruk 600 ml pr. tonn settepoteter. Ved behandling med f. eks. "Mantis-anlegg" kan Monceren FS 250 brukes ufortynnet, men kan også blandes ut med noe vann om det er ønskelig. Normalt brukes en total væskemengde på 1 liter væske pr tonn settepoteter.

RIFMO	PMR: NO05762358I Bayer CropScience DK	
	Form.: 576x150,5 mm	Date: 18-11-2014
	Artwork: 9823A	Country: NO
	Job no.: 34-4335/2135	Colour: CMYK
		☒ Use only for corrections
		☐ Print Ready PDF for upload to Server